ナーシング・グラフィカ 成人看護学⑥『緩和ケア』

第3版第1～2刷

以下の箇所に誤りがありました．謹んでお詫びし訂正いたします．

2章「身体症状とその治療・看護」　2節「疼痛の治療と看護」　3項「がん疼痛の治療と看護」
p. 82 表2. 2-9　オピオイド力価表

【誤】

表2.2-9　オピオイド力価表

	薬　剤	投与量 (mg／日．デュロテップ®MTパッチはmg／３日)				
経口・坐薬・経皮投与	モルヒネ（経口）	30	60	120	240	360
	モルヒネ（坐薬）	—	40	80	160	240
	オキシコンチン®	—	40	80	160	240
	タペンタドール	100	200	400	—	—
	ヒドロモルフォン	6	12	24	36	48
	デュロテップ®MT（パッチ）	2.1	4.2	8.4	16.8	25.2
	フェントス®（テープ）	1	2	4	8	—
	コデイン	180	—	—	—	—
	レペタン®（坐薬）	0.6	1.2	—	—	—
静脈・皮下注射	モルヒネ	—	30	60	120	180
	フェンタニル	—	0.6	1.2	2.4	3.6
	オキシコドン	—	15 (1.5A)	30 (3A)	120 (12A)	180 (18A)

【正】

表2.2-9　オピオイド力価表

	薬　剤	投与量 (mg／日．デュロテップ®MTパッチはmg／３日)				
経口・坐薬・経皮投与	モルヒネ（経口）	30	60	120	240	360
	モルヒネ（坐薬）	20	40	80	160	240
	オキシコンチン®	20	40	80	160	240
	タペンタドール	100	200	400	—	—
	ヒドロモルフォン	6	12	24	36	48
	デュロテップ®MT（パッチ）	2.1	4.2	8.4	16.8	25.2
	フェントス®（テープ）	1	2	4	8	—
	コデイン	180	—	—	—	—
	レペタン®（坐薬）	0.6	1.2	—	—	—
静脈・皮下注射	モルヒネ	15	30	60	120	180
	フェンタニル	0.3	0.6	1.2	2.4	3.6
	オキシコドン	15 (1.5A)	30 (3A)	60 (6A)	120 (12A)	180 (18A)

Copyright©2023 MEDICUS SHUPPAN, Publishers Co.,Ltd. All Rights Reserved.